

FATTORE DI RISCHIO	PUNTI
Neoplasia attiva (comprese le metastasi locali o a distanza e/o chemioterapia o radioterapia negli ultimi 6 mesi)	3
Progresso trombo-embolismo venoso (esclusa trombosi venosa superficiale)	3
Ridotta mobilità (previsione di allettamento per almeno 3 giorni, totale o con sola possibilità di andare fino in bagno vuoi per limitazione del paziente vuoi per ordine medico)	3
Trombofilia già nota (deficit di anti-trombina III, deficit di proteina C o S, resistenza alla proteina C attivata, fattore V di Leiden, mutazione G20210A della protrombina, sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi)	3
Recenti (≤ 1 mese) trauma e/o intervento chirurgico	2
Età ≥ 70 anni	1
Insufficienza cardiaca e/o respiratoria	1
Infarto miocardico acuto o stroke ischemico	1
Infezione acuta e/o malattia reumatologica attiva	1
Obesità (BMI ≥ 30)	1
Trattamento ormonale in atto (estrogeni-progestinici, tamoxifene ..)	1

FATTORI RISCHIO SANGUINAMENTO	PUNTEGGIO
PIASTRINE < 50.000	4
SANGUINAMENTO CLINICAMENTE RILEVANTE NEI TRE MESI ANTECEDENTI IL RICOVERO (vedi allegato 3)	4
ULCERA GASTRODUODENALE ATTIVA	4,5
INSUFFICIENZA RENALE MODERATA, GFR 30-59 ml/min	1
MASCHIO	1
48-84 ANNI	1,5
NEOPLASIA ATTIVA	2
MALATTIA REUMATOLOGICA	2
CATETERE VENOSO CENTRALE	2
TERAPIA INTENSIVA/UNITÀ CORONARICA	2,5
INSUFFICIENZA RENALE SEVERA, GFR < 30 ml/min	2,5
INSUFFICIENZA EPATICA (INR > 1,5)	2,5
>= 85 ANNI	3,5


Enoxaparina 4000 qd
 Off-label
 BMI 30-40 enoxaparina 6000 qd
 BMI > 40 enoxaparina 4000 x 2 o 8000 qd

PAZIENTI MEDICI

Funzione renale > 30 ml/min/1.73m²sc: enoxaparina 4000 U sc/die (o, in alternativa, calciparina 0.2 ml x2-3/die)

Funzione renale < 30 ml/min/1.73m²sc: enoxaparina 2000 U sc/die (o, in alternativa, calciparina 0.2 ml x2-3/die)

Geneva SCORE	Simplified version ⁸⁷
Previous PE or DVT	1
Heart rate	
75–94 b.p.m.	1
≥95 b.p.m.	2
Surgery or fracture within the past month	1
Haemoptysis	1
Active cancer	1
Unilateral lower-limb pain	1
Pain on lower-limb deep venous palpation and unilateral oedema	1
Age >65 years	1
Clinical probability	
<i>Three-level score</i>	
Low	0–1
Intermediate	2–4
High	≥5
<i>Two-level score</i>	
PE-unlikely	0–2
PE-likely	≥3



TREATMENT: ENOXAPARINA 100UI/KG bid